

„Ich zähle Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf :  
Die Pille. Verrändert Ihren Hormonhaushalt. Und kann  
viele Nebelwirkungen haben : Schweißausbrüche,  
Fackne im Gesicht, erröte Temperatur, Flegel-  
schmerzen etc. In Ihrem Alter wäre auch eine  
Skinnytable möglich. Dann gibt es die Spirale, ein  
t-förmiger Drahtseilakt, der in die Vagina eingesetzt  
wird. Und natürlich das Kondom. Das reißt leider  
manchmal oder hat ein Och. Das Femidom ist ähnlich,  
nur müht es der Mann nicht über sein Glied, sondern  
die Frau besetzt es auf den Muttermund. Oder Sie  
zählen Ihre vagen Tage. Dazu müßten Sie aber ein  
stabiles Leben kleben und eine genaue Wartbelle  
führen. Sollten Sie sich für das Diaphragma entkleiden,  
zeige ich Ihnen gerne, wie Sie das feinsetzen. Wenn  
Sie das Kondom bevorzugen, gibt es die Möglichkeit,  
das hier an Vibratoren zu üben. Das ist eine Art  
Spielzeugpenis, batteriebetrieben, gibt es nur in Steif.  
Bin ich zu schnell oder geht es so ?

Die Pille danach ist ein sicherer Horrormonschub, aller-  
dings nur binnerhalb von längstens 72 Stunden nach  
der Befruchtung wirksam. Und Mifegyne, die Abschrei-  
bungspille, ist derzeit in österreichlich blöd kaum auf  
dem Markt. Wenn Sie unkicher sind, was das Beste ist,  
rate ich Ihnen, sich mit anderen auszurauschen und zu  
fragen, wie die das standhaben. Es ist Ihr Leben,  
zuallerschwerst. Es ist Ihre Wahl.

Sie können bis zur 12. Bangerschaftswoche entscheiden,  
ob Sie das Kind wollen, sollen oder abtreiben möchten.“